

CONTEXTE

- > Depuis 2018, l'Etelcalcétide injectable (Parsabiv) permet de traiter l'hyperparathyroïdie des patients dialysés
- > Avant, seul un traitement oral délivré en pharmacie de ville était possible
- > À Santélyls, le Parsabiv est donné en 2nde intention depuis 2020, en cas d'échec des traitements conventionnels

Objectif de l'étude

Décrire l'administration de Parsabiv aux patients dialysés

MÉTHODES

- > Étude rétrospective, multicentrique et observationnelle

- > Population



- Patients dialysés à Santélyls
- Âgés ≥ 18ans
- Ayant reçu au moins une dose de Parsabiv entre le 01/01/2020 et le 01/03/2024

- > Source des données : DPI

- > Méthodologie

- Les caractéristiques sociodémographiques, de traitement et de biologie ont été comparées avec des tests univariés
- Les administrations de Parsabiv et l'évolution de la PTH ont été analysées par des statistiques descriptives
- Les doses administrées ont été colligées en séquences et analysées avec les méthodes d'appariement optimal et de classification hiérarchique (R Studio, package TraMineR) pour définir des trajectoires de traitement

RÉSULTATS



244 patients traités



41 unités de dialyse



Sex ratio H/F
1,38



Âge à la 1^{ère} dose de Parsabiv : 61,3 ans

Traitement et Biologie


	N=244
PTH (pg/mL) > 300 pg/mL à la 1 ^{ère} dose*	152 (91%)
1 ^{ère} dose de Parsabiv > 5 mg/séance	22 (9%)
Plus d'1 séquence de traitement	111 (45%)
Durée de la 1 ^{ère} séquence de traitement (en semaines)	20 (6,47)
Durée cumulée de traitement (en semaines)	40 (14,86)
Au moins 1 changement de dose**	147 (60%)
Changement de dose < 4 semaines	99 (41%)
Changement de dose > 5 mg	28 (11%)

n (%); Médiane (IQR)

* Valeurs non-documentées dans le DPI pour n=77 patients


** Au sein d'une même séquence

Évolution de la PTH



Étude de séquences

211 patients avec au moins 6 mois d'observation



	Classe 1 : Augmentation de la dose N=43	Classe 2 : Arrêt rapide N=58	Classe 3 : Dose stable de 15 mg N=67	Classe 4 : Dose stable de 7,5 mg N=43	p-value*
Femmes	17 (40%)	25 (43%)	26 (39%)	18 (42%)	>0,9
Âge	66,8 (48,1-77,1)	59,0 (47,2-70,1)	63,6 (49,0, 71,2)	61,0 (49,8, 74,2)	0,3
Ancienneté à Santélyls	3,8 (2,0-7,4)	3,3 (0,2-6,0)	4,2 (1,7, 6,6)	3,4 (0,9, 5,6)	0,3
1 ^{ère} dose (mg/sem)	7,5 (5,0-15,0)	5,0 (5,0-10,0)	7,5 (5,0, 10,0)	5,0 (2,5, 7,5)	0,006
PTH (pg /mL) à la 1 ^{ère} dose**	828.3 (644.2, 1,099.0)	846.7 (638.3, 1,121.8)	709.0 (534.0, 1,073.0)	774.6 (576.0, 892.3)	0,7

n (%); Médiane (IQR)

* Pearson's Chi-squared test; Kruskal-Wallis rank sum test

** Valeurs non documentées dans le DPI pour chaque classe, respectivement pour n=13, 22, 18, 11

CONCLUSION

- > Un nombre croissant de patients est traité par Parsabiv
- > Ce traitement induit une baisse progressive de la PTH sur un temps de traitement relativement long.